Conscientização sobre “brincadeiras” de desmaio

Professor Me. Fabrício Peres

Modalidades de Brincadeiras de Desmaio

- prender a respiração

- compressão da carótida - apertar o pescoço

- compressão do tórax - empurrar contra parede


Artéria Carótida Interna Direita
Artéria Carótida Interna Esquerda
Bulbos das carótidas
Artéria Vertebral Direita
Artéria Vertebral Esquerda
Aorta


Ar inalado
Costelas se elevam
músculos intercostais
contraem
Pulmão
Diafragma
Inalação
Diafragma contrai
(move-se para baixo)
Ar exalado
Costelas abaixam
músculos intercostais
relaxam
Exalação
Diafragma relaxa
(move-se para cima)



Modalidades de Brincadeiras de Desmaio

1.Consequência sistêmica : hipoxia tecidual

1.1 Hipóxia de curta duração: pode conduzir à breve perda de consciência.

1.2 Se o tempo de hipóxia se prologar, pode haver perda neuronal, reversível em um primeiro momento, com alterações da consciência e mesmo com sintomas convulsivos; mas podendo deixar consequências em casos de repetições sistemáticas.

Modalidades de Brincadeiras de Desmaio

2. Anóxia de longa duração (3 a 5 minutos):

2.1 Pode causar lesões neurológicas irreversíveis,

2.2 Desencadear sequelas de déficit sensório-motor (paralisia, paraplegia, quadriplegia).

2.3 Desencadear sequlas sensoriais (cegueira, surdez).

2.4 Encefalopatias (alteração patológica cerebral) e estado neurovegetativo de coma profundo ou de óbito

Motivos das Brincadeiras de Desmaio

1. Adesão ao risco: a criança/adolescente adota o ‘jogo’ visando à superação da angústia ou do medo do desconhecido.

2. Busca de uma sensação intensa: a criança/adolescente repetirá o ‘jogo’ se sua experiência de iniciação tiver sido positiva, podendo então reproduzi-lo sozinho.

Opinião Médica

Cardiologista do hospital Pró-Cardíaco, no RJ, Claudio Tinoco explica que as consequências da "*brincadeira*" podem ser graves, principalmente se o indivíduo tiver um problema cardíaco desconhecido.

A brincadeira causa queda de pressão, falta de oxigenação no sangue e a síncope, conhecida como desmaio. A falta de oxigenação pode levar a uma parada cardíaca ou a uma lesão no cérebro, com sequelas permanentes. A área da memória é a primeira a ser danificada, mas o adolescente pode ainda ter parte da visão afetada. Em casos mais sérios, pode haver coma e morte cerebral

Jogo de asfixia: não é brincadeira

A morte de um adolescente paulista lançou luz sobre os jogos de desmaio, praticados por quatro em cada dez jovens brasileiros

O TAMANHO DO PROBLEMA

Dados preliminares de um levantamento feito com 1.395 crianças francesas e brasileiras, de 9 a 12 anos

40% JÁ BRINCARAM DE ASFIXIA

10% JÁ CHEGARAM A DESMAIAR

ONDE APRENDEM

FRANÇA
No período integral da escola

BRASIL
Em casa ou com amigos

VÍDEOS SOBRE O JOGO NO YOUTUBE NO BRASIL

2010: **500**

2016: **16.000**

MORTES

1.121

SEQUELAS

135

ÉPOCA

Adolescente morre nos EUA tentando imitar brincadeira que viu no YouTube

Um adolescente de 15 anos da cidade de Chula Vista, na Califórnia, morreu nesta semana em uma brincadeira perigosa que está fazendo sucesso na internet. David Nuno estava em casa com dois amigos, e resolveu reproduzir um dos vídeos que estão se multiplicando no YouTube, de adolescentes induzindo desmaios.

Jovem morre depois de inalar gás de buzina em festa em Rio Preto

Este é o 2º caso de morte por causa do gás no noroeste paulista neste ano. Segundo a polícia, ela teve parada cardíaca após inalar gás de buzina.

Uma estudante de 18 anos morreu na madrugada deste sábado (26) depois de inalar gás de buzina em um condomínio residencial em São José do Rio Preto (SP).

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser atendida por uma equipe de resgate, mas morreu antes que pudesse ser levada a uma unidade de saúde mais próxima. Segundo a polícia, ela teve uma parada cardíaca depois de ter inalado gás de buzina. O gás propano, usado na buzina, pode causar asfixia e efeito alucinógeno

Código Penal

Art. 122 - Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou reclusão, de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.

Art. 129 - Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.

Art. 132 - Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente:
Pena - detenção, de três meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Estatuto da Criança e do Adolescente

Criança: até completar 12 anos.

Adolescente: entre 12 e 18 anos.

Responsabilidade Civil = enquanto menores de idade (18 anos, sob autoridade dos pais).

Responsabilidade Criminal = Atos Infracionais

Criança: Medidas de Proteção

Adolescente: Medidas Socioeducativas / Intern